Efemerópteros nuevos de la República Argentina

Por el R. P. Longinos Navás S. J.

Gustoso contribuiré con mi pequeño y modesto óbolo a las iniciativas de la ilustre Sociedad Entomológica Argentina, agradeciendo a la par su benevolencia para conmigo. En esta comunicación reuniré las descripciones de tres especies nuevas que he podido estudiar recientemente entre los muchos ejemplares que poseo, enviados en años anteriores por mis amigos y corresponsales de la Argentina.

Familia **Leptoflébidos**

1. **Thraulus larensis** sp. nov. (fig. 1.).

Similis *missionensi* Pet.

Caput piceum, oculis fusco-nigris; antennis albidis, primo articulo fusco.



Fig. 1 — *Thraulus larensis* Nav.
Ala posterior
(Col. m.)

Torax piceus, nitidus.

Abdómen superne fuscum, tergitis 2-8 margine anteriore et maculis fulvis; inferne fulvo-ferrugineum; urodiis fulvis, nigro anguste annulatis; cercis seu forcipe fusco-piceis, apice fulvis.

Pedes femoribus ferrugineis, apice obscurioribus, tibiis tarsisque fulvis. Alae membrana hyalina, reticulatione fulva. *Ala anterior* in medio interno arearum costalis et subcostalis leviter fulvo-ferrugíneo tincta; venis subcostali et radiali ferrugineis; area costali pluribus venulis divisa; in regione stigmatica fere 13 venulis obliquis; venulis discalibus areolas rectangulares formantibus; venula ad basim inter cubitum et axillarem primam arcuatam.

Ala posterior (fig. 1) membrana leviter ad basim antice fulvo-ferrugineo tincta; pluribus venulis (3-5) apicalibus ultra angulum costalem acutum; aliis venulis intervenas.

Long. corp. ♂	7'2	mm.
— al. ant.	8'4	„
— urod.	10	„

Patria. Argentina: Punta Lara (Prov. de Buenos Aires), 5 de noviembre de 1922.

Varios ejemplares en mi colección enviados por el señor J. M. Bosq. De Lara la ha llamado *larensis*.

Familia **Bétidos**

2. **Pseudocloëon Bruchi** sp. nov.

Caput fuscum, oculis turbinatis grandibus, parte superiore depressa, fusco-ferrugiena.

Thorax fusco-piceus, nitidus, inferne vix pallidior.

Abdomen duobus primis et ultimis tergitis fuscis, intermediis fulvis, inferne subtotum fulvum; urodiis albidis, leviter flavidis, ad articulationes angustissime fuscatis.

Pedes flavidi.

Alae hyalinae, irideae, reticulatione tota albida, parum sensibili, venis subcostali et radiali vix obscurioribus; regione stigmatica 6-7 venulis obliquis, sejunctis, haud reticulata.

Long. corp. ♂	2'5	mm.
— al. ant.	3'6	„
— al. post.	6	„

Patria. República Argentina: Alta Gracia (Prov. de Córdoba), 28 de diciembre de 1921. Varios ejemplares.

Distínguese fácilmente del *Th. Jörgenseni*. Pet. por el menor tamaño y por la malla de las alas, de un blanco uniforme.

3. **Pseudocloëon Weiseri** sp. nov. (fig. 2).

Caput ferrugineum, oculis in sino nigris, parte superiore oculorum depressa.

Thorax fulvo-ferrugineus, nitens.

Abdomen superne fulvo-ferrugineum, margine postico segmentorum obscuriore, inferne fulvum; urodiis fulvo-pallidis, anguste fusco annulatis.

Pedes fulvo-flavi.

Alae hyalinae, irideae, reticulatione conspicua, fuscescente, regione stiginali (fig. 2), 10-12 venulis, partim inter se connexis, seu partim reticulata; venis marginalibus intercalatis longiusculis, gradatim versus basim brevioribus, ad basim vel quarto interno marginis posterioris singulis vel nullis.

Long. corp. ♀	4	mm.
— al	5'5	„
— urod.	7'5	„



Fig. 2 — *Pseudocloëon Weiseri* Nav.
Región estigmática del ala izquierda.
(Col. m.)

Patria. República Argentina: (Catamarca), 7 de marzo de 1924. Weiser. Tres ejemplares en mi colección enviados por el señor J. M. Bosq.

Aunque se parece al *Ps. Jörgenseni* Pet. por el tamaño y parte por su coloración, distínguese al momento por la malla de las alas, que es bien visible y coloreada por igual en esta especie, siendo poco perceptible en aquélla.

Zaragoza, 15 de marzo de 1926.